

## 11 歳のお子さんの保護者の方へ

新型コロナワクチンの接種に使用するワクチンの種類は、1 回目の接種日の年齢によって異なります。接種については、同封の説明書などをよく読んでお子さんと相談し、ご判断ください。

① 1 回目の接種を受ける日の年齢が 11 歳の場合※ → **5～11 歳用ファイザー社ワクチン**

1 回目に 5～11 歳用のワクチンを接種した方は、2 回目接種日に 12 歳になっていても 5～11 歳用のワクチンを接種することになります。

※12 歳の誕生日の**前々日まで**に 1 回目のワクチン接種を受ける場合をいいます。

例) 3 月 30 日に 12 歳の誕生日を迎えるお子さんの場合

3 月 28 日までに 1 回目のワクチンを接種する場合 **①のワクチンを 2 回接種**します。

3 月 29 日以降に 1 回目のワクチンを接種する場合 **②のワクチンを 2 回接種**します。

② 1 回目の接種を受ける日の年齢が 12 歳の場合 → **成人用 (12 歳以上用) ワクチン**

### ワクチンの種類について

ワクチンの種類	① 5～11 歳用 ファイザー社ワクチン	② 12 歳以上用 ファイザー社ワクチン	② 12 歳以上用 モデルナ社ワクチン
接種場所	市内の医療機関または 市の集団接種会場	市内の医療機関	県の集団接種会場
接種回数と 接種間隔	<b>2 回</b> 2 回目は 1 回目の <b>21 日後※</b>	<b>2 回</b> 2 回目は 1 回目の <b>21 日後※</b>	<b>2 回</b> 2 回目は 1 回目の <b>28 日後※</b>
1 回の接種の量	<b>0.2m l</b> 有効成分は成人用の 1/3	0.3m l	0.5m l
接種部位	肩の筋肉に接種	肩の筋肉に接種	肩の筋肉に接種
ワクチンの有効性 や安全性	いずれのワクチンも接種により、中和抗体が上昇すること、重症化予防効果や発症予防の効果があることが確認されて、薬事承認を受けています。 副反応については、注射部位の痛み、頭痛、倦怠感、寒気、発熱などがあります。ごくまれにアナフィラキシー、心筋炎、心膜炎などの重い副反応の事例もあります。5～11 歳の男性においても、2 回目接種時に心筋炎が報告されています。しかし、その報告頻度は 12～15 歳及び 16～17 歳の男性と比較して低かったことが確認されています。詳しくはワクチンの説明書をご覧ください。		
ワクチン接種の費用	いずれのワクチンも公費負担で、自己負担はなく無料で接種を受けることができます。		

※1 回目の接種を予約する際、2 回目の接種日の予定も確認して予約をお願いします。